

Admission. — M. le Dr CAZENEUVE, médecin aide-major de 1^{re} classe, Corps de débarquement, Casablanca (Maroc). *Coléoptères.*

Présentations. — M. Maurice CORET, 53 bis, boulevard de Picpus, Paris, 14^e, présenté par M. A. JANET. — Commissaires-rapporteurs : MM. R. PESCHET et A. PEUVRIER.

— M. Eugène MOREAU, 58, avenue d'Orléans, Paris, 14^e, présenté par M. L. BEDEL. — Commissaires-rapporteurs : MM. H. DONCKIER DE DONCEEL et J. DE JOANNIS.

Communications.

Les *Omphreoides* de Madagascar; description d'une espèce nouvelle
[COL. CARABIDAE, HEXAGONINI]

par Ch. ALLUAUD.

On connaît actuellement trois espèces, toutes de Madagascar, appartenant au genre *Omphreoides* Fairm.; ce sont :

1. *O. bispinus* Fairm., *Bull. Soc. ent. Fr.*, [1896], p. 50. — Diego-Suarez, montagne d'Ambre (ALLUAUD 1893).

2. *O. furcatus* Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, [1897], p. 172. — Imerina, Andrangoloaka (SIKORA).

3. *O. bucculentus* Alluaud, *Bull. Mus. d'Hist. nat.*, [1899], p. 413. — Baie d'Antongil (MOCQUERYS).

Une quatrième espèce, très distincte et bien remarquable, m'a été donnée par M. A. FAUVEL, qui l'avait reçue de M. le lieutenant QUOD à qui je me fais un plaisir de la dédier.

Omphreoides Quodi, n. sp. — Long. totale 14 mill. — Entièrement noir brillant. Tête étroite et allongée, deux fois plus longue que large, à côtés subparallèles avec deux sillons juxtaoculaires profonds; étranglée près de la base et formant un col court; très plate en dessous. Menton trilobé coupé très droit à sa base et portant un très gros point enfoncé en face de chacun des deux angles rentrants des lobes. Immédiatement derrière la suture (très droite) du menton, la tête porte quatre points enfoncés disposés sur une ligne transversale

droite. Thorax lisse environ de la même longueur et de la même largeur que la tête (largeur prise aux globes oculaires qui sont peu saillants); rebordé finement sur les côtés et portant au milieu un sillon longitudinal très profond. Écusson en triangle très allongé. Épaules largement arrondies. Élytres entiers, munis chacun au sommet d'une épine courte, éloignée de la suture de la largeur de deux intervalles, et légèrement recourbée en dedans. Stries nettes mais peu profondes, effacées à la base et ponctuées seulement à leur origine basilaire; intervalles plans.

A un fort grossissement, on voit que les intervalles sont très finement chagrinés et que les ongles des trois paires de pattes sont munis d'une petite dent médiane interne.

Les autres caractères sont ceux des *Hexagoniini*. L'exemplaire décrit est un ♂ (un seul pore sétigère de chaque côté du bord apical du dernier segment abdominal; la ♀ en ayant deux de chaque côté).

Hab. : Imerina central, Tsinjoarivo près du massif de l'Ankaratra, point culminant de Madagascar). Lieutenant Quod, 1899.




Fig. 1. — *Omphreooides Quodi* Alluaud, $\times 5$ (1).

Tableau des espèces.

I. Tête, y compris les yeux, pas plus large que le pronotum.

1. Tête et pronotum très étroits, très allongés, sillon médian du pronotum large et profond. *O. Quodi* Alluaud.
2. Tête et pronotum normaux, sillon médian du pronotum composé d'une simple ligne enfoncée. Épines terminales des élytres droites presque parallèles, rapprochées de la suture..... *O. bispinus* Fairm.

II. Tête, y compris les yeux, plus large que le pronotum.

(1) Je dois le dessin qui accompagne cette description à l'obligeance de M. L. GARRETA.

1. Tête ayant sa plus grande largeur aux globes oculaires et allant en se rétrécissant vers le cou. Épines terminales des élytres divergentes et distantes de la suture..... *O. furcatus* Alluaud.
2. Tête ayant sa plus grande largeur aux joues (énormes) qui précèdent immédiatement le cou, par conséquent allant en s'élargissant des yeux vers le cou.....
..... *O. bucculentus* Alluaud.

**Observations sur les *Cardiophorus ovipennis* Desbr.
et *C. hoploderus* Cand. [COL. ELATERIDAE]**

par H. DU BUYSSON.

1° *Cardiophorus ovipennis* et variétés. — Comme cette espèce est très peu répandue dans les collections, il m'a semblé utile de mettre en valeur ses caractères. Dans ses Opuscules entomologiques, I, p. 38 (1875), DESBROCHERS la décrit en ces termes : « voisin du *conformis*, bien plus large et plus épais, ferrugineux ou brun de poix, avec les angles du prothorax, les antennes et les pattes roux; prothorax très bombé, visiblement élargi en devant; quelques points un peu moins fins, peu distincts de la ponctuation foncière; élytres ovalaires, à stries fortes jusqu'au sommet, subcrénelées par les points; intervalles très convexes; crochets des tarsi simples. Long. 8-9 mill. — Chypre ».

Je complète cette description par de menus détails de coloration auxquels l'auteur, à juste titre, n'a pas cru devoir s'arrêter. Je peux dire que le *type* de DESBROCHERS (et *a fortiori* celui de M. PIC, tout nouvellement décrit) offre la mentonnière, la pointe prosternale et la base des flancs prothoraciques, la marge postérieure du métasternum, la partie rétrécie des hanches postérieures, le bord des segments abdominaux et aussi l'écusson, d'un ferrugineux sombre.

Ceci connu, rapprochons-en la description textuelle du *C. cypricus* PIC, *L'Échange*, N° 305, p. 33 (1910) et nous trouverons que M. PIC a redécrit la même espèce et que son *type* ne diffère de celui de DESBROCHERS que par d'infimes détails de coloration qui ne semblent pas justifier la conservation de ce nom pour désigner une variété. Le *C. cypricus* PIC est ainsi décrit : « assez robuste, peu allongé, brillant, revêtu d'une fine pubescence grise en partie chatoyante, noir ou noir de poix avec les angles antérieurs, parfois tout le bord antérieur